

Prevence - MOR:

- zjišťování příčin úhynů včelstev a jejich slábnutí
- nepoužívání úlů, vč. potřeb, zařízení, medu, pylu, plástů a vosku pro krmení a chov včel z lokalit s neznámou nakažovou situací a dobou jejich použití
- zamezení přístupu včel do neobsazených úlů a včelího díla
- údržba prázdných úlů bez včelího díla
- vyhledávání a utrácení divoce žijících včelstev a rojů neznámého původu
- provádění průběžné dezinfekce úlů, zásobních plástů a včelařských potřeb
- provádění obnovy díla
- důsledná léčba varroázy
- nedání důvodu včelám ke slídění a loupeži
- nevyhazování do odpadu nevymytých spotřebitelských obalů od medu
- upozorňovat spotřebitele na nebezpečí představující obaly, zejména sklenice od kontaminovaného medu, především medu zahraničního původu
- pravidelné plošné preventivní prohlídky
- zákaz léčení moru včelího plodu
- u zakoupených, přemístěných včelstev provádění zvýšené kontroly zdravotního stavu
- chovat včely na více stanovištích s menším počtem včelstev
- veterinární dozor nad komerčními chovy matek a výrobními mezistěn
- povinné ošetření vosku při 117 °C po dobu 60 minut ve všech komerčních výrobních mezistěn, nebo 150 °C po dobu 5-10 minut
- správné nakládání s odpadními vodami ve včelařských provozovnách, zasítování oken a zabezpečení vchodů, vstupů a otvorů proti vnikání včel
- pravidelné bakteriologické vyšetření importovaných medů
- namátkové vyšetřování tuzemských medů

Včasně odhalení moru ve včelstvech může zamezit jeho dalšímu šíření na okolní stanoviště.

Včelaři sami by měli nejen pozorněji než dosud sledovat zdravotní stav včelstev, dodržovat chovatelské zásady a nařízená veterinární opatření, ale také sledovat situaci kolem svého stanoviště.

Nebezpečí, které hrozí našemu včelařství z nepříznivého vývoje nakažové situace a šíření moru včelího plodu, je hrozné. Nelze zatím předvídat další vývoj.

Šanci ubránit se máme jen tehdy, uvědomíme-li si toto nebezpečí všichni a budeme společně, důsledně a vytrvale uplatňovat všechna známá a platná ochranná opatření proti šíření této nákazy.

ŠÍŘENÍ NÁKAZY

Do úlu se nákaza dostane nejčastěji vyloupáním na mor uhynulých včelstev, dále chytáním rojů neznámého původu, zalétáváním včel, infikovanými plásty a jiným včelařským náradím, nákazu mohou rozšiřovat i roztoči a jiní škůdci, jež se infikují a uskuteční mechanický přenos.